



# Patienteninformation zur Bestimmung der Katecholamine und deren Metaboliten im 24 Stunden-Sammelurin

## Achtung!



Mit der Sammelflasche erhalten Sie 10 mL 10,0%ige **Salzsäure** zur Stabilisierung des Urins, welche zu Beginn der Sammelperiode in den Behälter gegeben werden muss! Den Inhalt nicht mit Haut oder Kleidung in Kontakt bringen! Bei versehentlichem Kontakt mit sehr viel Wasser abspülen; ggf. Ihren Arzt konsultieren!

## Sammeln des Urins:

1. Am ersten Morgen den **ersten Urin** in die Toilette entleeren, nicht sammeln.
2. Jeden Urin in den nächsten **24 Stunden** in ein geeignetes Gefäß ablassen, dann in die Sammelflasche umfüllen und stets **kühl** lagern.

Scheuen Sie sich nicht die Sammelflasche in den Kühlschrank zu stellen. Flasche und Verschluss sind absolut dicht und lassen keinen Uringeruch durch.

3. Vor jedem Stuhlgang zuerst den Urin sammeln.
4. Am zweiten Morgen den **ersten Urin** (zur gleichen Zeit wie am Vortag) sammeln.
5. Urinmenge an der Skala ablesen und in das Schriftfeld der Sammelflasche eintragen.
6. Sammelflasche umgehend nach der Sammelperiode dem behandelnden Arzt oder dem Labor zurückgeben.

Vielen Dank!