





Untersuchungen nach den "Mutterschafts-Richtlinien"

Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung
zuletzt geändert am 19. Februar 2015, in Kraft getreten am 5. Mai 2015, Stand: Juni 2015

Verfahren	Bitte beachten	Material	
Antikörpersuchtest (AKS)	1. AKS möglichst frühzeitig nach Feststellung der Schwangerschaft 2. AKS 24. – 27. SSW Cave: bitte vor Rhesusprophylaxe-Gabe abnehmen!	EDTA-Blut	
Blutgruppe, Rhesusfaktor (Rhesusformel, Kell-Ag)	Immer separates, volles EDTA-Röhrchen einschicken! Anforderungsschein unterschrieben? Patientenidentität eindeutig? Möglichst frühzeitig nach Feststellung der Schwangerschaft (falls nicht bereits bekannt)	EDTA-Blut	
Chlamydia trachomatis-DNA	Möglichst frühzeitig nach Feststellung der Schwangerschaft	Erststrahlurin (unabhängig von der Tageszeit), in Spezialmedium	
Eiweiß und Glucose im Urin, Urinsediment ggf. bakteriologische Untersuchung	Alle 4 Wochen	Urin, nativ	
Glucose OGTT 50 g Screening	24+0 - 27+6 SSW, unabhängig vom Zeitpunkt der letzten Mahlzeit, NICHT nüchtern Abnahme 1h nach Gabe von 50g Glucoselösung	GlucoEXACT	
Glucose OGTT 75 g	nach mind. 8h Nahrungskarenz (nüchtern) Abnahme nüchtern, 1h und 2h nach Gabe von 75g Glucoselösung	GlucoEXACT	
Hämoglobin (Hb), ggf. kleines/großes Blutbild	Alle 4 Wochen Erythrozytenzahl bei Hb < 11,2 g/dL	EDTA-Blut	
HBs-Ag (Heptatis B, surface Ag)	nach 32. SSW, wenn kein Impfnachweis vorliegt	Serum-Gel-Monovette	
HIV-Ak	Auf freiwilliger Basis, Beratung Möglichst frühzeitig nach Feststellung der Schwangerschaft	Serum-Gel-Monovette	
Rötelnvirus-Ak, IgG	Impftiter, wenn kein Impfnachweis vorliegt, ggf. Röteln-Ak, IgM	Serum-Gel-Monovette	
Treponema pallidum-Ak (Lues-Screeningtest)	Möglichst frühzeitig nach Feststellung der Schwangerschaft	Serum-Gel-Monovette	

Bitte immer Gestationsalter und – falls erforderlich (z. B. AFP) – auch Gewicht und Körpergröße angeben!

Weitere häufige Untersuchungen im Rahmen einer Schwangerschaft

Verfahren	Bitte beachten	Material	
Infektionsserologie (bitte mit Angabe IgG/IgM): Cytomegalovirus-Ak (CMV-Ak) Parvovirus B19-Ak Toxoplasmosa gondii-Ak Varizella-Zoster-Ak Masernvirus-Ak Mumpsvirus-Ak Bordetella pertussis-Ak	Möglichst frühzeitig nach Feststellung der Schwangerschaft	Serum-Gel-Monovette	
Ferritin	Möglichst frühzeitig nach Feststellung der Schwangerschaft	Serum-Gel-Monovette	
TSH	Möglichst frühzeitig nach Feststellung der Schwangerschaft	Serum-Gel-Monovette	
β-HCG		Serum-Gel-Monovette	
Vaginalabstrich: B-Streptokokken, allgemeine Bakteriologie, Pilze	Zwischen 35+0 und 37+0 SSW	Abstrich mit Transportmedium	
Alpha-1-Fetoprotein (AFP)	Bestimmung in der 15. - 20. SSW, SSL 45 – 84mm) Cave: Einwilligungserklärung gemäß GenDG, Angabe Körpergewicht und Gestationsalter	Serum-Gel-Monovette	
Ersttrimesterscreening (mit Risikoberechnung) PAPP-A, freies β-HCG + Ultraschallergebnisse	Bestimmung in der 11+1 – 13+6. SSW Bitte auf vollständig ausgefüllte klinische Angaben und Ultraschallergebnisse achten, Einwilligungserklärung gemäß GenDG	Serum-Gel-Monovette	
Harmony-Test	Bitte auf vollständig ausgefüllte Angaben achten, Einwilligungserklärung gemäß GenDG	Spezielles Abnahmeset	

Bitte immer Gestationsalter und – falls erforderlich (z. B. AFP) – auch Gewicht und Körpergröße angeben!