

Untersuchungen nach den Mutterschafts-Richtlinien

Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung,
zuletzt geändert am 22. März 2019, in Kraft getreten am 28. Mai 2019

Verfahren	Bitte beachten	Material	
Antikörpersuchtest (AKS)	1. AKS: möglichst frühzeitig nach Feststellung der Schwangerschaft 2. AKS in der 24. – 27. SSW Cave: Blut bitte vor Rhesusprophylaxe-Gabe abnehmen!	EDTA-Blut (groß) 9mL	
Blutgruppe, Rhesusfaktor, (Rhesusformel, Kell-AG)	Immer separates, volles 9 mL-EDTA-Röhrchen einschicken! Möglichst früh nach Feststellung der Schwangerschaft (falls nicht bereits bekannt). Röhrchen beschriftet mit Name, Vorname, Geburtsdatum und Barcode? Anforderungsschein unterschrieben?	EDTA-Blut (groß) 9mL	
Chlamydia trachomatis - DNA	Möglichst frühzeitig nach Feststellung der Schwangerschaft	<u>Erststrahlurin</u> , (unabhängig von Tageszeit), in Spezialmedium	
Eiweiß und Glucose im Urin, ggf. bakteriologische Untersuchung	Alle 4 Wochen	Urin, nativ	
Glucose OGTT 50g Screening	24+0 - 27+6 SSW, Blutabnahme 1 Stunde nach Gabe von 50g Glucose-Lösung, unabhängig von Nahrungsaufnahme	GlucoEXACT	
Glucose OGTT 75g	nach mindestens 8 Stunden Nahrungskarenz ; Blutabnahme nüchtern, 1 und 2 Stunden nach Gabe von 75g Glucose-Lösung	GlucoEXACT	
Hämoglobin (Hb), ggf. kleines/großes Blutbild	Alle 4 Wochen, bei Hb < 11,2g/dL zusätzlich Erythrozytenzahl	EDTA-Blut	
HBsAg	nach 32. SSW, wenn kein Impfnachweis vorliegt	Serum-Gel-Monovette	
HIV	Auf freiwilliger Basis, Beratung Möglichst frühzeitig nach Feststellung der Schwangerschaft	Serum-Gel-Monovette	
Röteln-IgG Ak	Impftiter, wenn kein Impfnachweis vorliegt, ggf. Röteln-IgM Ak	Serum-Gel-Monovette	
TPPA (Lues-Screeningtest)	Möglichst frühzeitig nach Feststellung der Schwangerschaft	Serum-Gel-Monovette	

Bitte immer Gestationsalter und - falls erforderlich (z. B. AFP) – auch Gewicht und Körpergröße angeben!

Weitere häufige Untersuchungen im Rahmen einer Schwangerschaft

Verfahren	Bitte beachten	Material	
CMV-Ak, Parvovirus B19-Ak , Toxoplasma gondii-Ak, VZV- Ak, Masernvirus-Ak, Mumpsvirus- Ak Bordetella pertussis-Ak	Möglichst frühzeitig nach Feststellung der Schwangerschaft Immunstatus: nur IgG-Ak (eingeschränkte Aussagekraft) Infektionsnachweis/-ausschluss: IgG- + IgM-Ak bzw.+ IgA-Ak (ggf. AKZ 32024)	Serum-Gel-Monovette	
Ferritin TSH	Möglichst frühzeitig nach Feststellung der Schwangerschaft	Serum-Gel-Monovette	
β-HCG		Serum-Gel-Monovette	
Vaginalabstrich: B-Streptokokken, allgemeine Bakteriologie, Pilze	Zwischen 35+0 und 37+0 SSW	Abstrich mit Transportmedium	
AFP	Nur für die 14.-18. SSW (13+0 bis 17+6) möglich , da nur für diesen Zeitraum Mediane für die Ermittlung der MoM-Werte (Multiple of Median) vorliegen. Angabe von Körpergewicht und Gestationsalter obligat! Einwilligungserklärung gemäß GenDG muss vorliegen.	Serum-Gel-Monovette	
Ersttrimesterscreening (ETS) mit Risikoberechnung PAPP-A, freies β-HCG + Ultraschallergebnisse + klinische Angaben	Nur in der 11+1 – 13+6. SSW (SSL 45 – 84 mm) möglich! Eine ETS-Risikoberechnung durch das Labor kann nur erfolgen, wenn Sie bei www.firsttrimester.net über einen eigenen Account verfügen und als durchführendes Labor unsere Labor-ID eingetragen ist. Bitte setzen Sie sich ggf. mit: www.firsttrimester.net in Verbindung, um einen <i>eigenen Account</i> zu erstellen. In anderen Fällen kann aufgrund der durch die der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) vorgegebenen Rahmenbedingungen eine ETS-Risikoberechnung durch das Labor nicht erfolgen. Bitte auf vollständige klinische Angaben und Ultraschallergebnisse achten, Einwilligungserklärung gemäß GenDG erforderlich!	Serum-Gel-Monovette	
Ersttrimesterscreening ohne Risikoberechnung PAPP-A, freies β-HCG	Die Praxis führt die Risikoberechnung selbst durch (z. B. FMF, firsttrimester.net). Zur Ermittlung der MoM-Werte Angabe des Gestationsalters obligat! Einwilligungserklärung gemäß GenDG muss vorliegen.	Serum-Gel-Monovette	
VeriSeq-NIPT	Bitte auf vollständig ausgefüllte Angaben achten, Einwilligungserklärung gemäß GenDG erforderlich!	Spezielles Abnehmeröhrchen	

Bitte immer Gestationsalter und - falls erforderlich (z. B. AFP) – auch Gewicht und Körpergröße angeben!